

110 學年度四技二專統一入學測驗

衛生與護理類專業(二) 試題

- 根據研究指出，規律運動可以預防疾病、促進健康，關於運動對一般人身體影響的描述，下列何者不正確？
(A)增強肌力 (B)減少體脂肪 (C)提升血糖值 (D)強化心肺功能。
- 維持「健康體位」有哪些好處？①可以不禁口，一直吃；②罹患慢性病的機率降低；③可以熬夜、不運動；④有利於壽命延長
(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)②④。
- 小慧今年 18 歲，與大學新同學們一起進行健康檢查，小慧身高 160 公分，體重 50 公斤；同學宜庭身高 155 公分，體重 62 公斤；鈞鈞身高 170 公分，體重 60 公斤；欣欣身高 165 公分，體重 62 公斤，小慧和她的同學們誰的身體質量指數(BMI)值不在正常範圍內？
(A)小慧 (B)宜庭 (C)鈞鈞 (D)欣欣。
- 丁女士健康檢查結果如下，下列檢驗項目及數據何者符合代謝症候群的診斷指標？①腰圍 86 公分；②血壓 138/88mmHg；③空腹血糖 98mg/dl；④總膽固醇 180mg/dl；⑤三酸甘油脂 185 mg/dl；⑥高密度膽固醇 52mg/dl。
(A)①④⑤ (B)②③⑥ (C)①②⑤ (D)③④⑥。
- 呼吸道傳染病流行期間的自我健康管理原則，下列敘述何者正確？
(A)一定要用酒精洗手，才有防疫效果
(B)耳溫攝氏 38 度、沒有症狀，尚不須特別注意
(C)因對疫苗效果不確定，即使有核可的疫苗也不宜注射
(D)與他人無法保持 1 公尺以上的社交距離，就要戴上口罩。
- 下列哪些是世界衛生組織公告之肺結核自我檢測項目？①體重減輕；②咳嗽有痰；③體重增加；④沒有食慾；⑤咳嗽有血絲；⑥咳嗽超過兩週。
(A)②③④ (B)①②⑥ (C)①⑤⑥ (D)③④⑤。

7. 嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)流行期間應配合政府宣導之防疫措施，下列敘述何者正確？
- (A)居家隔離是與確定病例接觸所採取之防疫措施
 - (B)居家隔離是針對具有國外旅遊史者採取之防疫措施
 - (C)居家隔離期間不得出境或出國，但可以去住家樓下超商
 - (D)有流鼻水症狀之自主健康管理者，可以搭乘捷運與友人見面。
8. 關於老年人居家安全之敘述，下列何者正確？①家具皆為固定式；②熱水器可以放在室內；③廚房應加裝瓦斯警報器；④浴室拖鞋宜有防滑設計；⑤為增進老年人視覺刺激，居家擺設宜時常變換；⑥為避免眼睛受刺激，室內光線宜昏暗。
- (A)②③⑥ (B)①⑤⑥ (C)①③④ (D)②④⑤。
9. 關於活躍老化的方式，下列敘述何者正確？
- (A)避免受傷，減少身體活動
 - (B)參加宗教或社團活動，尋求心靈寄託
 - (C)為減少挫折，不須再學習新知
 - (D)為減少衝突，儘量忍氣吞聲。
10. 有關與老年人溝通之技巧，下列敘述何者正確？
- (A)為增加溝通效果，儘量提高音頻說話
 - (B)儘量用語言表達，避免使用圖片
 - (C)為減少壓迫感，應避免眼神接觸
 - (D)可合併非語言(例如手勢)的溝通方式。
11. 關於老人易出現之生理變化，下列敘述何者正確？
- (A)心肌收縮力降低
 - (B)對於近期事物的記憶勝過遠期的記憶
 - (C)感覺神經的反應更敏感
 - (D)較不易辨認低頻率的聲音。
12. 關於老年人用藥之敘述，下列何者最適當？
- (A)老年人對於藥物的耐受性較高
 - (B)依醫師建議在固定的時間服用藥物
 - (C)症狀改善後應立刻停藥，以減少對腎臟的損傷
 - (D)一般老年人的代謝差，用藥劑量均較成年人為低。
13. 當癌症末期的患者出現下列何種反應時，代表面對死亡是秉持著正向的態度？
- (A)為避免觸霉頭儘量不參加他人喪禮
 - (B)為自己策劃與辦理一場生前告別式
 - (C)為避免子孫不孝故不宜先分配財產
 - (D)死亡一定是痛苦與難分難捨的歷程。

14. 關於深二度燒傷的陳述，下列何者正確？①傷及大部分真皮深層；②外觀可見栓塞的血管；③對痛較不敏感；④皆須植皮傷口才能癒合；⑤約 21 天可癒合。
(A)①②⑤ (B)①③④ (C)①③⑤ (D)②④⑤。
15. 緊急事故發生時，對傷患優先處理的順序為何？①有致命性創傷已無呼吸者；②車禍大量出血者；③小腿骨折者；④脊椎受傷意識清楚者。
(A)①②④③ (B)①④②③ (C)②①④③ (D)②④③①。
16. 在意外事件現場，協助各類傷患處理的最佳姿勢，下列何者正確？①熱衰竭者應採平躺腳抬高；②中風失去意識者應平躺頭部墊高；③胸部因撞擊受傷者應採半坐臥式；④血壓低暈倒者應採平躺腳屈膝。
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④。
17. 有關自動體外心臟去顫器(Automated External Defibrillator, AED)使用的陳述，下列何者不正確？
(A)去顫電擊的步驟是：開、貼、插、電
(B)去顫器在進行心律分析時應該持續 CPR
(C)對兒童施救，若無兒童電擊片可以成人電擊片取代
(D)以 AED 搶救患者，施救者適用緊急避難免責規定。
18. 執行成人心肺復甦術時，吹了兩口氣發現患者胸部沒有起伏，此時最適當的措施為何？
(A)再檢查頸動脈評估心跳狀態 (B)重新做下顎推擠法檢查呼吸道
(C)採側臥姿勢檢查是否有異物 (D)立即執行哈姆立克法。
19. 有關嬰兒心肺復甦術的敘述，下列何者正確？
(A)以兩手指壓胸，深度至少胸廓前後徑 1/3
(B)胸部按壓的速度至少 120 次/分鐘
(C)胸部按壓的位置為劍突上 1 橫指處
(D)人工呼吸前應先深呼吸，吹兩口氣每一次 2 秒。
20. 小明 10 歲體重 38 公斤，游泳時不小心溺水，被救起來後，發現沒有反應也沒有心跳呼吸，現場只有你一個人，有關執行心肺復甦術的敘述，下列何者正確？①先打 119 求援；②先進行五個循環 CPR 再打 119 求援；③按壓胸部深度要 5 - 6 公分；④按壓胸廓深度至少 1/3，勿超過 5 公分。
(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④。

21. 有關哈姆立克急救法的敘述，下列何者正確？
(A)嬰兒若沒有哭叫聲可給予拍背和壓胸交替手法排除異物
(B)意識清楚者在執行哈姆立克後，須以手指探入挖出異物
(C)對於意識昏迷者應加快執行速度以移出梗塞物
(D)施救孕婦可以拳頭或椅背協助擠壓橫膈位置排除異物。
22. 有關異物處理的原則，下列何者最為適當？
(A)魚刺卡在喉嚨時，可吞一大口飯協助化解
(B)眼睛有異物飛入時，可用口吹氣移除
(C)昆蟲進入耳朵時，可直接用掏耳器掏出
(D)異物進入鼻孔時，可輕壓另一側鼻孔擤出。
23. 有關緊急救護系統的敘述，下列何者最不適當？
(A)沒有 SIM 卡的手機也可以撥 112 啟動緊急救護系統
(B)緊急傷病患運送是以載送病患至其指定醫院為原則
(C)待產的孕婦可以尋求緊急救護系統的協助
(D)離島、偏遠地區難以診治傷患可以啟動系統轉診。
24. 由於近期瘦身美容的糾紛不勝枚舉，行政院衛生福利部訂定瘦身美容定型化契約範本，以保障消費者的權利，據此消費者可要求業者提供下列哪些契約內容？
(A)須含效果保證
(B)未達效果保證退費
(C)消費者至少有 7 日契約審閱期
(D)契約書一式兩份均由消費者保存。
25. 下列何項內容可出現在健康食品廣告中？
(A)恢復視力
(B)改善喉嚨發炎
(C)促進腸胃蠕動
(D)衛部健食字第 A00000 號。
26. 遇到醫療糾紛的處理方式，一般不包括下列何者？
(A)和解
(B)調解
(C)訴訟
(D)打電話給 1966。
27. 小美自從成為上班族後，體重就一直增加，忙碌的生活以及上班的壓力造成小美暴飲暴食，小美想了幾個方法減肥，下列何者較適當？①使用影音平台廣告介紹可以減肥的瘦菌，強調一週可以瘦 3 - 5 公斤；②找減重診所醫師討論，尋求幫助；③購買同學推銷價格昂貴的減重酵素，保證瘦下來後不復胖；④安排自己的時間旅遊或與朋友聚會，轉移工作上的注意力；⑤養成運動的好習慣。
(A)①②③
(B)③④⑤
(C)②④⑤
(D)②③④。

28. 關於正確使用健保資源之敘述，下列何者正確？①小病到小醫院，大病到大醫院就診；②建立健康生活型態，減少緊急就醫；③多看幾個醫生，聽取診斷重點以避免誤診；④沒有用完的藥物轉贈遠方親友以減少浪費；⑤多使用自費藥品及藥材，以節省健保資源。
- (A)①② (B)①④ (C)②③ (D)②⑤。
29. 下列何者是提升自尊及自信心的具體方法？①發揮專長挑戰自我；②努力維持完美外在形象；③設立目標不達成功絕不放棄；④多參與志工服務。
- (A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④。
30. 下列何者是壓力常造成的生理反應與對健康可能的影響？①甲狀腺素下降導致甲狀腺機能亢進；②胃酸分泌減少導致便秘；③腎上腺素上升導致心跳加快；④醅皮質素分泌增加導致免疫力下降。
- (A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④。
31. 關於同理心與同情心的差異，下列敘述何者正確？
- (A)同情心是指能從對方的角度立場思考
(B)同情心是能感同身受了解他人的心情
(C)同理心是能了解他人情緒背後真正的原因
(D)同理心是能放棄自己原來的想法而接受對方的想法。
32. 社會支持在成功因應壓力上扮演相當重要的角色，當同學課業成績不佳時，你協助同學複習功課，這是屬於提供何種社會支持？
- (A)情緒支持 (B)工具性支持 (C)訊息支持 (D)評價支持。
33. 因情緒調節障礙產生焦慮、畏懼等情緒，最可能是下列何種精神障礙？
- (A)精神官能症 (B)思覺失調症 (C)妄想症 (D)情感性精神病。
34. 關於「心情憂鬱」與「憂鬱症」的敘述，下列何者正確？①持續憂傷是「心情憂鬱」；②大部分時間出現情緒低落並伴有體重改變、睡眠改變、注意力不集中、失去活力是「心情憂鬱」；③憂鬱情緒與相關症狀持續超過兩週且嚴重影響日常生活功能為「憂鬱症」；④遇到挫折造成心情低落但未影響日常生活功能是「心情憂鬱」
- (A)①② (B)③④ (C)②③ (D)①④。

35. 有關毒品分級的敘述，下列何者正確？①依毒品之成癮性、濫用性及對社會的危害性進行分級；②總共分成三級；③罰則的嚴重程度：第一級 < 第二級 < 第三級；④罰則的嚴重程度：製造 > 意圖販賣 > 施用 > 持有。
- (A)①② (B)③④ (C)①④ (D)②③。
36. 關於毒癮戒治的敘述，下列何者正確？
- (A)一般療程是心理戒治→生理戒治→追蹤輔導
(B)追蹤輔導一般採用家族治療措施
(C)生理戒治一般採用電擊方式
(D)放鬆訓練為生理戒治的一部分。
37. 小米與小仁交往 1 年，但最近小米發現與小仁對用錢的觀念差距太大，想要提出分手，下列何種分手方式最適當？
- (A)在社群媒體上公開自己已與小仁分手，並封鎖小仁
(B)跟小仁說他不負責任又愛亂花錢，不想與他繼續交往
(C)請小仁的好朋友協助轉達分手的決定，並請朋友安慰他
(D)跟小仁說因兩人對金錢使用的觀念差異過大，不適合繼續交往。
38. 小育很欣賞班上的一位同學，希望利用出遊機會來增加對彼此的了解，下列何種邀約方式較為適當？
- (A)邀請他和其友人一起參加他喜歡的活動
(B)請好朋友轉交邀請卡給他，以免被拒絕尷尬
(C)找時間跟他告白，希望與他單獨去 KTV 的包廂唱歌
(D)寫一封情書表達對他的愛慕，邀請他共進燭光晚餐。
39. 有關心理學家史坦伯格(Sternberg)於 1986 年提出的「愛情三角形理論」，下列敘述何者正確？
- (A)彼此有強烈的吸引力，隨時都想要看到對方，此為「親密」成份
(B)決定彼此長相廝守，願意共同經營愛的關係，此為「承諾」成份
(C)希望透過溝通、心與心的交流而相知相惜，此為「激情」成份
(D)想和對方有更進一步的接觸、發展身體親密關係，此為「親密」成份。

40. 關於「負責及尊重的愛」之具體表現，下列行為何者最適當？
- (A)如果對方不喜歡使用保險套，應尊重與配合對方的要求
 - (B)做好避孕措施下發生婚前性行為，是向對方證明愛的具體表現
 - (C)與心儀的對象交往一陣子後可發展親密性關係，以鞏固自己在對方的地位
 - (D)對方發出性行為邀請時，若認為自己生理及心理上未準備好，應拒絕並表明立場。
41. 下列何種方式除了避孕效果外，也可用以改善女性經期不規則或痛經的困擾？
- (A)口服避孕丸
 - (B)輸卵管結紮術
 - (C)事後避孕丸
 - (D)含銅子宮內避孕器。
42. 有關保險套的使用方式，下列敘述何者正確？
- (A)可以水性潤滑液輔助使用
 - (B)應在男性快射精之前戴上
 - (C)可以戴二層提高避孕效果
 - (D)應收藏於隨身皮夾內方便取用。
43. 有關選擇終止妊娠方式，下列敘述何者正確？
- (A)妊娠 3 週可以採用事後避孕丸
 - (B)妊娠 10 週可以採用子宮內灌注前列腺素
 - (C)妊娠 6 週可以採用 RU-486 藥物
 - (D)妊娠 24 週可以採用子宮內膜搔刮術。
44. 有關愛滋病毒感染之預防與篩檢，下列敘述何者正確？
- (A)透過一次血液篩檢可準確判斷是否感染愛滋病毒
 - (B)發生危險性行為後，應立即前往醫院進行愛滋病毒血液篩檢
 - (C)與愛滋病毒帶原者接觸時，應戴上口罩及手套
 - (D)孕婦應接受愛滋病毒血液篩檢，避免將病毒傳染給新生兒。
45. 小隸和小雯已交往半年，小隸認為小雯如果愛他，應該可以有親密的性關係，但小雯認為婚前不應該有性行為，此時小雯的回應方式何者最適當？
- (A)小隸根本只想佔她便宜並不是愛她，立即與他絕交
 - (B)請小隸再忍耐一下，等到自己覺得有興趣時再看狀況決定
 - (C)向小隸明確表示兩人還在交往階段，希望等到結婚後再有性關係
 - (D)不想傷害小隸的心，在做好避孕措施後，勉強與小隸發生性關係。

46. 有關人體受精與懷孕之過程，下列敘述何者正確？
(A)正常著床是指受精卵植入於母體的輸卵管
(B)懷孕滿 2 個月時，母體通常可明顯感覺到胎動
(C)預產期通常是以女性最後一次月經第一天的日期，加上 9 個月又 7 天計算而來
(D)胚胎著床後 3 週內細胞開始快速分裂，此期胎兒主要器官皆已發育，可清楚辨識人形。
47. 下列何者為罹患乳癌的危險因子？①酗酒；②攝取高脂肪高熱量食物；③初經過晚；④運動過量；⑤過早懷孕。
(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)③⑤。
48. 臺灣法律目前對同性戀者的保障，不包括下列何者？
(A)承認同性婚姻 (B)受家庭暴力防治法保護
(C)開放同性戀家庭收養無血緣的子女 (D)保障同性婚姻財產繼承。
49. 有關性別之描述，下列何者正確？①性別角色是指每個人個性中所帶有的陽剛或陰柔特質；②性別氣質是指每個特定社會對於不同性別與責任的期待與觀念；③性傾向是指個人在情感與對性吸引對象上的偏好；④性別認同是指個人對於自己性別身分的認同
(A)①② (B)③④ (C)①④ (D)②③。
50. 目前對於非異性戀者「LGBTQ」通稱的敘述，下列何者正確？①L：Lady 是指女同性戀者；②G：Gay 是指男同性戀者；③B：Boy 是指有男性傾向的女同性戀者；④T：Transgender 是指跨性別者；⑤Q：Queer 是指無法定義或自己不定義性別認同者。
(A)①③④ (B)①②③ (C)②③④ (D)②④⑤。

衛生與護理類專業(二) - 【解答】

- 1.(C) 2.(D) 3.(B) 4.(C) 5.(D) 6.(B) 7.(A) 8.(C) 9.(B) 10.(D)
11.(A) 12.(B) 13.(B) 14.(C) 15.(D) 16.(A) 17.(B) 18.(B) 19.(A) 20.(C)
21.(A) 22.(D) 23.(B) 24.(C) 25.(CD) 26.(D) 27.(C) 28.(A) 29.(D) 30.(C)
31.(C) 32.(B) 33.(A) 34.(B) 35.(C) 36.(D) 37.(D) 38.(A) 39.(B) 40.(D)
41.(A) 42.(A) 43.(C) 44.(D) 45.(C) 46.(C) 47.(A) 48.(C) 49.(B) 50.(D)

110 學年度四技二專統一入學測驗

衛生與護理類專業(二) 試題詳解

- 1.(C) 2.(D) 3.(B) 4.(C) 5.(D) 6.(B) 7.(A) 8.(C) 9.(B) 10.(D)
11.(A) 12.(B) 13.(B) 14.(C) 15.(D) 16.(A) 17.(B) 18.(B) 19.(A) 20.(C)
21.(A) 22.(D) 23.(B) 24.(C) 25.(CD) 26.(D) 27.(C) 28.(A) 29.(D) 30.(C)
31.(C) 32.(B) 33.(A) 34.(B) 35.(C) 36.(D) 37.(D) 38.(A) 39.(B) 40.(D)
41.(A) 42.(A) 43.(C) 44.(D) 45.(C) 46.(C) 47.(A) 48.(C) 49.(B) 50.(D)

- (A)增強肌力；(B)減少體脂肪；(C)降低血糖值；(D)強化心肺功能。
- 健康體位可以降低罹患慢性病的機率、且有利於壽命延長。
- 身體質量指數(BMI)值分別是：
(A)小慧 19.5；(B)宜庭 25.8；(C)鈞鈞 20.8；(D)欣欣 22.8。
滿 18 歲的成人 BMI 標準值為 18.5 ~ 24。
- 代謝症候群的診斷指標為：
(1)女性腰圍 ≥ 80 公分；
(2)血壓 $\geq 130/85$ mmHg；
(3)空腹血糖 ≥ 100 mg/dl；
(4)三酸甘油脂 ≥ 150 mg/dl；
(5)高密度膽固醇女性低於 50mg/dl；
五項中有三項達危險值就是代謝症候群患者，以後罹患慢性病的機率大增。
- (A)用肥皂及清水洗手 20 秒以上，才是較好防疫效果；(B)耳溫攝氏 38 度、即便沒有其他症狀，亦需就醫；(C)接種疫苗才能產生抵抗力，減少社區群聚感染；
(D)與他人無法保持 1 公尺以上的社交距離，就要戴上口罩。
- 世界衛生組織公告之肺結核自我檢測項目：
胸痛 1；咳嗽有痰 2；體重減輕 1；沒有食慾 1；咳嗽超過兩週 2；總分達 5 分或以上，應立即就醫。
- 居家隔離是與確定病例接觸所採取之防疫措施；居家隔離期間不得外出；有流鼻水症狀之自主健康管理者，應立即就醫，不可搭乘大眾運輸工具。

8. 瓦斯熱水器只能放室外，否則應有強制排氣的裝置；居家擺設不宜時常變換，以免老人絆倒；室內光線要充足。
9. (A)維持身體活動或合宜的運動，增加肌肉量，可以減少跌倒意外；(C)學習新知可增加成就感、提升自尊感；(D)有負面情緒要有適當的抒發管道，以維持心理健康。
10. (A)高音頻的聲調老人不易聽清楚；(B)使用圖片幫忙表達清楚；(C)適度眼神接觸，表達溫暖與關切。
11. (B)對於近期事物的記憶低於遠期的記憶；(C)感覺神經的反應遲鈍；(D)較不易辨認高頻率的聲音。
12. (A)老年人對於藥物的代謝較差、較慢；(C)停藥與否，應以醫囑為準則；(D)一般老年人的代謝差，更要注意按醫囑服用藥物的時間及劑量。
13. 為自己策劃與辦理一場生前告別式；財產分配應及早規劃。
14. ①傷及大部分真皮深層；③對痛較不敏感；⑤約 21 天可癒合。
15. 車禍大量出血者→ 脊椎受傷意識清楚者→ 小腿骨折者→ 有致命性創傷已無呼吸者。
16. ②中風失去意識者應復甦姿勢；④血壓低暈倒者應採平躺腳抬高。
17. 去顫器在進行心律分析時應該暫停 CPR。
18. (B)重新做下顎推擠法檢查呼吸道。
19. (B)胸部按壓的速度 100 ~ 120 次/分鐘；(C)胸部按壓的位置為劍突上 2 橫指處；(D)人工呼吸前只需自然呼吸，吹兩口氣每一次 1 秒。
20. ②先進行五個循環 CPR 再打 119 求援；③按壓胸部深度要 5 ~ 6 公分(大於 8 歲)。
21. (B)意識清楚者在執行哈姆立克後，須以手指清除口中異物；(C)對於意識昏迷者應立即給予心肺復甦術；(D)施救孕婦可以拳頭擠壓胸骨下段。
22. (A)魚刺卡在喉嚨時，輕咳喉嚨，如果還覺得疼痛，應就醫；(B)眼睛有異物飛入時，可用棉棒沾水清除異物；(C)昆蟲進入耳朵時，可用光罩引出，或滴油悶死蟲子再就醫。
23. 緊急傷病患運送是以適當的時間載送病患至適當醫院為原則。
24. (C)消費者至少有 7 日契約審閱期；(D)契約書一式兩份，一份自己存留、一份店家。
25. (A)恢復視力；(B)改善喉嚨發炎都屬於療效，健康食品不可聲稱有療效。
26. 打電話給 1950。1966 是長照服務專線。

27. ①不輕易相信這種廣告；而且減重速度以一週減 0.5 ~ 1.0 公斤為原則。
28. 藥物不可轉贈。
29. ②接受自己的身體形象；③設定小目標，並欣賞自己的成果。
30. ①甲狀腺素上升導致甲狀腺機能亢進；②自律神經失調導致便秘或腹瀉，或交替出現。
31. (A)同理心是指能從對方的角度立場思考；(B)同理心是能感同身受了解他人的心情。
32. 工具性支持：是指實質上的幫助，例如出錢、出力。
33. 因情緒調節障礙產生焦慮、畏懼等情緒，最可能是精神官能症。
34. ①持續憂傷是「憂鬱症」；②大部分時間出現情緒低落並伴有體重改變、睡眠改變、注意力不集中、失去活力是「憂鬱症」。
35. ①依毒品之成癮性、濫用性及對社會的危害性進行分級；
②總共分成四級；
③罰則的嚴重程度：第一級 > 第二級 > 第三級；
④罰則的嚴重程度：製造 > 意圖販賣 > 施用 > 持有。
36. (A)一般療程是生理戒治→心理戒治→追蹤輔導；(B)追蹤輔導是協助吸毒犯回歸社會，進行就業、界學、觀護、監管，防止復發再犯；(C)生理戒治一般採用藥物治療、放鬆訓練為主。
37. (D)跟小仁說因兩人對金錢使用的觀念差異過大，不適合繼續交往。當面說清楚分手理由，不責怪對方。
38. (A)邀請他和其友人一起參加他喜歡的活動。兩人交往尊重對方的意願，並以團體活動維修先安排，就是團體活動→小團體→單獨活動→固定交往。
39. (A)彼此有強烈的吸引力，隨時都想要看到對方，此為「激情」成份；(B)決定彼此長相廝守，願意共同經營愛的關係，此為「承諾」成份；(C)希望透過溝通、心與心的交流而相知相惜，此為「親密」成份；(D)想和對方有更進一步的接觸、發展身體親密關係，此為「激情」成份。
40. (D)對方發出性行為邀請時，若認為自己生理及心理上未準備好，應拒絕並表明立場。拒絕婚前性行為，把真愛留給結婚的對象是最好的選擇。
41. 口服避孕丸：可抑制排卵達到避孕效果。在月經週期的第五天開始吃，一天一顆，連續 21 天，停 7 天，讓月經來，然後再吃下一包，月經規則、因為是低劑量荷爾蒙，經血量也少，所以少發生痛經問題。

42. (A)可以水性潤滑液輔助使用；(B)應在性器官接觸前就戴上；(C)只需戴一個，可能因為摩擦而破損；(D)應收藏於室溫、避免太陽直曬。
43. (A)事後避孕丸是預防懷孕，而非中止懷孕；(B)子宮內灌注前列腺素是懷孕 12 週以後使用的引產方式；(C)妊娠 7 週內可以採用 RU - 486 藥物；(D)妊娠 12 週內可以採用子宮內膜搔刮術。
44. 每 3 ~ 6 個月透過血液篩檢可判斷是否感染愛滋病毒；愛滋病毒經由血液和性行為傳染。
45. (C)向小隸明確表示兩人還在交往階段，希望等到結婚後再有性關係。拒絕婚前性行為，把真愛留給結婚的對象是最好的選擇。
46. (A)正常著床是指受精卵植入於母體的子宮；(B)懷孕滿 5 個月時，母體通常可明顯感覺到胎動；(C)預產期通常是以女性最後一次月經第一天的日期，加上 9 個月又 7 天計算而來；(D)胚胎著床後 8 週內細胞開始快速分裂，此期胎兒主要器官發展階段，但仍無法辨識人形。
47. ①酗酒；②攝取高脂肪高熱量食物；③初經過早、停經過晚；⑤未曾懷孕或哺乳。
48. 同性婚姻之收養，僅允許繼親收養及同性配偶親子女收養，並無明文允許收養無血緣關係的子女。
49. 性別角色是指社會對於不同性別與責任的期待與觀念；性傾向是指個人在情感與對性吸引對象上的偏好；性別認同是指個人對於自己性別身分的認同。
50. 「LGBTQ」L：Lesbian 女同性戀、G：Gay 男同性戀、B：Bisexual 雙性戀、T：Transgender 是指跨性別者、Q：Queer 是指無法定義或自己不定義性別認同者。

ALeader